

Hábitat 1230. Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas.

1. Catalogación

Hábitat de interés comunitario.

2. Descripción general del hábitat

Definición

Los acantilados costeros vegetados son pendientes escalonadas situadas sobre la costa, originadas por la erosión marina, que mantienen una gran diversidad de tipos de vegetación, como respuesta a una variable influencia marina.

El hábitat 1230 integra las dos primeras bandas de vegetación del acantilado, es decir, las comunidades halocasmofíticas xerófilas, instaladas en las fisuras de los roquedos marítimos, y las praderas eurohalinas de fisionomía graminoide, presentes en los suelos más desarrollados de los taludes.

Relaciones con otras clasificaciones

El hábitat 1230 se relaciona con las siguientes formaciones de la clasificación CORINE (1991):

- 18.21. Comunidades atlánticas de acantilados (*Atlantic cliff communities*)

Del mismo modo, el hábitat 1230 se relaciona con las siguientes formaciones de la clasificación Paleártica (Palearctic Classification 1996):

- 18.21. Comunidades de los acantilados del norte (*Northern sea-cliffs communities*)

Descripción

- Asociaciones fitosociológicas que lo describen:
Crithmo maritimi-Limonietum binervosi, *Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae*, *Armerio depilatae-Limonietum ovalifolii*, *Spergulario rupicolae-Armerio depilatae*, *Asplenietum marini*, *Festuco pruinosa-Brachypodietum rupestres*, *Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosa*, *Leucanthemo crassifolii-Helicrysetum stoechadis*, *Plantagini maritimae-Schoenetum nigricantis*, *Festuco pruinosa-Juncetum maritimi*, *Limonio binervosi-Caricetum extensa*, *Crithmo maritimi-Brassicetum oleracea*, *Beto maritimae-Lavateretum arborece*, *Crithmo maritimae-Frankenietum laevis*, *Festuco pruinosa-Elymetum pycnanthi*.

- Plantas características del hábitat:
Crithmum maritimum, *Armeria maritima*, *Limonium* spp., *Brassica oleracea*,
Silene uniflora, *Plantago maritima*, *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*, *Daucus*
spp., *Aplonium Marinus*, *Inula crithmoides*.

Subtipos

No se reconocen subtipos en este hábitat.

Problemas de Interpretación

El hábitat 1230 no debe ser confundido con las comunidades de playas y cantos situadas en la base de los acantilados (hábitats tipo 1210 y 1220), ni con los matorrales y helechales desarrollados, como una tercera banda de vegetación del acantilado, a continuación del hábitat 1230.

3. Distribución del hábitat

En la red Natura 2000 en Cantabria




Figura I.13. Distribución del hábitat 1230 en la red Natura 2000 en Cantabria (Fuente: IH Cantabria, 2009).

En la red Natura 2000 en España



Figura I.14. Distribución del hábitat 1230 en la red Natura 2000 de las provincias de la Región Biogeográfica Atlántica de la Península Ibérica (Fuente: MMARM, 2009).